



Renovação com Responsabilidade

ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

GABINETE DO VEREADOR  
JEORGENES CASTRO E SILVA

PROJETO DE LEI 335 /2022.

"INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PACIENTES COM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS ATIVAS MODERADAS OU GRAVES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**A Câmara municipal de Maracanaú Decreta:**

**Art. 1º** Esta Lei institui o atendimento preferencial para pacientes com doenças inflamatórias intestinais crônicas ativas no âmbito do Município de Maracanaú.

**Art. 2º** Para os fins desta lei consideram-se doenças inflamatórias intestinais crônicas a doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa ativas, em grau moderado ou grave, assim definidos por profissional médico.

**Art. 3º** Ficam todos os órgãos públicos, as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas obrigadas a realizar o atendimento preferencial aos pacientes com doenças inflamatórias intestinais crônicas, a Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa ativas, em grau moderado ou grave.


**§ 1º** Os estabelecimentos comerciais que recebam pagamentos de contas, as agências bancárias e casas lotéricas deverão incluir os pacientes com doenças inflamatórias intestinais crônicas ativas, em grau moderado ou grave, nas filas já destinadas aos idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência.

**§ 2º** A identificação dos usuários se dará por meio de cartão de identificação da APD!IMT – Associação de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais, filiada a DII Brasil, reconhecida pela ABCD – Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, formado por médicos brasileiros, por comprovação através de exames médicos e laudos.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, em 06 de setembro de 2022.**

Atenciosamente,

  
Jeorges Castro e Silva  
Vereador





Renovação com Responsabilidade


ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

**Justificativa**

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas do trato gastrointestinal e correspondem, principalmente, à doença de Crohn (DC) e à retocolite ulcerativa (RCU). Acredita-se que a etiopatogenia da doença, apesar de ainda não bem esclarecida, relaciona-se a uma resposta inflamatória inapropriada a micróbios intestinais em indivíduos geneticamente predispostos. Em relação aos fatores socioambientais, as DII possuem uma distribuição global heterogênea, sendo mais prevalentes em indivíduos de raça caucasiana, que vivem em áreas urbanas e industrializadas de países desenvolvidos, como Europa Ocidental e América do Norte. A distribuição entre os sexos é uniforme, e o pico de início da doença se dá entre 15 e 30 anos de idade, com um segundo pico menos significativo entre os 50 e 70 anos. Nos últimos anos, tem-se observado um aumento considerável na sua incidência, mas os motivos desse aumento ainda não foram identificados. As DII possuem formas de apresentação clínica variadas. Os sintomas podem variar desde manifestações intestinais leves até quadros clínicos graves, com necessidade de internação hospitalar e cirurgias. A intensidade dos sintomas depende do tipo de DII, da localização e extensão da doença, intensidade da inflamação, presença DII na urgência: como conduzir 148 de manifestações extraintestinais e complicações. A sua história natural pode variar entre quadros indolentes, progressivos ou graves, e a doença costuma evoluir com períodos de remissão intercalados com períodos de exacerbação. Na RCU, a inflamação costuma ser difusa, confinada à mucosa e submucosa, e restrita ao cólon e reto. O comprometimento mucoso é contínuo e ascendente, e a transição entre o tecido acometido e o tecido normal é nítida e bem demarcada. Os sintomas mais comuns são diarreia, hematoquezia, tenesmo e dor abdominal, podendo variar desde uma doença leve até quadros clínicos graves. As principais complicações da RCU são enterorragia, megacólon tóxico e colite aguda grave. Na DC, a inflamação afeta toda a parede do intestino, desde a mucosa até a serosa, podendo acometer qualquer porção do trato digestório. O local mais comumente afetado é o íleo terminal e o cólon, e as lesões apresentam um padrão de acometimento descontínuo, ou seja, presença de segmentos acometidos intercalados com mucosa normal. Os sintomas mais comuns são fraqueza, diarreia crônica, dor abdominal e perda ponderal, sendo que um terço dos pacientes também apresenta doença perianal, com dor local, fissuras, abscessos e fistulas perianais. submeto a apreciação desta Casa de Lei e solicito apoio aos meus Nobres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, em 06 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

  
Jeorgenes Castro e Silva  
Vereador

